

Vaccin 6 en 1

Informations pour les parents

Qu'est-ce que le vaccin 6 en 1 ?

Le vaccin 6 en 1 protège votre nourrisson contre six maladies : la diphtérie, l'hépatite B, Haemophilus influenzae type b (Hib), la polio, le tétanos et la coqueluche.

En quoi consistent ces maladies ?

La diphtérie est une infection bactérienne qui peut provoquer un encombrement du nez, de la gorge ou des voies aériennes.

Symptômes : maux de gorge, fièvre, migraines et accélération du rythme cardiaque.

Complications éventuelles : insuffisance cardiaque, paralysie, problèmes respiratoires graves ou difficultés à avaler.

L'hépatite B est une infection virale qui affecte le foie et peut être à l'origine d'une infection à vie. Complications éventuelles : cirrhose, cancer ou insuffisance hépatique.

Hib est une infection bactérienne qui peut entraîner une inflammation du cerveau (méningite), un empoisonnement du sang (septicémie), des bronchites et des otites. Symptômes : fièvre, vomissements, migraines et raideur de la nuque.

La polio est une infection virale qui affecte le système nerveux et peut provoquer une paralysie.

Le tétanos (ou « trismus ») est une maladie qui provoque des spasmes musculaires douloureux, des convulsions et des difficultés respiratoires. Cette maladie est souvent fatale.

La coqueluche est une infection bactérienne à l'origine d'une toux sèche qui empire progressivement. Ses quintes de toux peuvent évoquer le chant du coq. Complications éventuelles : graves difficultés respiratoires, pneumonie, insuffisance cardiaque et pulmonaire, lésions cérébrales.

6 in 1 Parent Information leaflet - French

Toutes les maladies énumérées ci-dessus sont des maladies graves pouvant entraîner le décès.

À qui est destiné le vaccin 6 en 1 ?


Le vaccin 6 en 1 est destiné aux nourrissons à l'âge de 2, 4 et 6 mois. Il est donc fortement recommandé d'emmener votre enfant chez votre médecin généraliste pour le faire vacciner gratuitement.

Pourquoi le vaccin 6 en 1 à la place du vaccin 5 en 1 ?

Le vaccin 6 en 1 inclut tous les vaccins compris dans le vaccin 5 en 1 ainsi que le vaccin contre l'hépatite B.

En Irlande, le nombre de cas d'hépatite B a augmenté tous les ans entre 1996 et 2005. Ces dernières années, plus de 800 cas ont été signalés chaque année (cf. graphique).

Nombre de cas signalés d'hépatite virale B 1982-2006 (source : HPSC)



L'ajout du vaccin contre l'hépatite B au calendrier vaccinal des enfants permettra de protéger les jeunes Irlandais dès à présent et lorsqu'ils grandiront. Délivrer le vaccin aux enfants dès leur plus jeune âge est la meilleure méthode pour prévenir les infections par le virus de l'hépatite B chez l'ensemble de la population.

Quels sont les enfants qui ne doivent pas recevoir le vaccin 6 en 1 ?

Le vaccin 6 en 1 est contre-indiqué pour très peu d'enfants. Vous ne devez pas faire vacciner votre enfant si un vaccin précédent ou un des composants du vaccin a entraîné chez lui une réaction allergique (anaphylaxis).

Quels symptômes peuvent se manifester après la vaccination ?

Chez certains enfants, le site d'injection peut être douloureux, rouge ou boursoufflé. Votre enfant peut être irritable et avoir de la fièvre. Dans ce cas, vous pouvez lui administrer du paracétamol ou de l'ibuprofène. Il doit également boire beaucoup. Assurez-vous qu'il n'a pas trop chaud et que ses vêtements ne frottent pas le site d'injection.

Pour obtenir de plus amples informations :

- contactez votre médecin généraliste ou une infirmière de la santé publique ;
- demandez la brochure « **Your child's immunisations – A guide for parents** » (« **L'immunisation de mon enfant - un guide destiné aux parents** ») à votre infirmière de la santé publique ;
- consultez le site www.immunisation.ie ou www.hpsc.ie

Publié par : HSE National Immunisation Office

Date de publication : avril 2008

Code de commande : HNI00510