

Szczepionka 6 w 1

Informacje dla rodziców

Czym jest szczepionka 6 w 1?

Szczepionka 6 w 1 chroni niemowlęta przed sześcioma chorobami: błonicą, wirusowym zapaleniem wątroby typu B, bakterią haemophilus influenzae typu B (Hib), polio, tężcem oraz kokluszem.

Czym charakteryzują się te choroby?

Błonica to choroba bakteryjna, która może powodować naloty w nosie, gardle lub drogach oddechowych.

Objawy: ból gardła, gorączka, ból głowy i szybkie bicie serca.

Możliwe powikłania choroby serca, paraliż, poważne problemy z oddychaniem oraz problemy z przełykaniem.

Wirusowe zapalenie wątroby typu B to infekcja wirusowa, która atakuje wątrobę i może powodować długotrwałe zapalenie. Możliwe powikłania: marskość wątroby, rak lub niewydolność wątroby.

Hib to infekcja bakteryjna, która może wywołać zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (meningitis), posocznicę (septicaemia), zapalenie oskrzeli oraz zapalenie ucha.

Objawy: gorączka, wymioty, bóle głowy i sztywność karku.

Polio to infekcja wirusowa atakująca układ nerwowy i mogąca powodować paraliż.

Tężec (szczękościsk) to choroba powodująca bolesne skurcze mięśni i mogąca doprowadzić do ataków padaczkowych oraz problemów z oddychaniem. W przypadku tej choroby, śmiertelność jest duża.

Koklusz to choroba zakaźna, która wywołuje nasilający się kaszel prowadzący do duszności. Może mu towarzyszyć charakterystyczne "świszczenie".

Możliwe powikłania: poważne trudności w oddychaniu, zapalenie płuc, niewydolność serca i płuc oraz uszkodzenie mózgu.

Wszystkie choroby opisane powyżej są poważne i mogą doprowadzić do śmierci.

Komu należy podawać szczepionkę 6 w 1?


Szczepionka 6 w 1 jest podawana niemowlętom 2-miesięcznym, 4-miesięcznym oraz 6-miesięcznym. Aby otrzymać bezpłatną szczepionkę należy przyjść z dzieckiem do lekarza rodzinnego.

Dlaczego stosować szczepionkę 6 w 1 a nie 5 w 1?

Szczepionka 6 w 1 zawiera wszystkie szczepionki, które wchodzi w skład szczepionki 5 w 1 oraz szczepionkę przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B.

W Irlandii liczba przypadków zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu B wzrastała co roku w okresie 1996 - 2005. W ostatnich latach, odnotowano ponad 800 przypadków zachorowań na rok (patrz wykres).

Ilość odnotowanych zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu B w latach 1982-2006 (źródło: HPSC)



Włączenie szczepionki przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B do programu szczepień dzieci w Irlandii uchroni je przed zachorowaniem w dzieciństwie i gdy będą starsze. Podawanie szczepionki w najwcześniejszych latach życia stanowi najskuteczniejszy sposób ochrony populacji przed wirusowym zapaleniem wątroby

typu B.

Komu nie powinno podawać się szczepionki 6 w 1?

Bardzo niewiele jest osób, którym nie należy podawać szczepionki 6 w 1. Nie należy podawać tej szczepionki dzieciom, które wykazały reakcje alergiczne (anafilaksja) na wcześniejsze dawki szczepionki lub któryś ze składników szczepionki.

Czego oczekiwać po szczepieniu?

Niektóre dzieci mogą odczuwać lekki ból, swędzenie lub może pojawić się zaczerwienienie w miejscu wykonania zastrzyku. Dziecko może być rozdrażnione lub gorączkować. Wtedy należy podać dziecku paracetamol lub ibuprofen dla dzieci. Powinno ono również dużo pić. Należy upewnić się, że dziecku nie jest zbyt gorąco oraz że ubrania nie ocierają o miejsce, w które wstrzyknięto szczepionkę.

Dodatkowe informacje

- Należy skontaktować się z lekarzem rodzinnym lub pielęgniarką środowiskową
- Należy poprosić o kopię przewodnika dla rodziców **Your child's immunisations – A guide for parents** pielęgniarkę środowiskową
- Należy wejść na stronę www.immunisation.ie lub www.hpsc.ie

Wydano: HSE National Immunisation Office

Data wydania: Kwiecień 2008

Kod zamówienia: HNI00510