

## Vaccinul 6 în 1 Informații pentru părinți

### Ce este vaccinul 6 în 1?

Vaccinul 6 în 1 vă protejează copilul împotriva a șase boli: difterie, hepatită B, haemophilus influenzae tip B (Hib), poliomielită, tetanos și tuse convulsivă.

### Ce sunt aceste boli?

**Difteria** este o boală bacteriană care determină formarea unei membrane groase la nivelul nasului, gâtului sau căilor aeriene.

Simptomele bolii: durere în gât, febră, cefalee și tahicardie.

Posibile complicații: insuficiență cardiacă, paralizie, probleme severe de respirație sau dificultăți la înghițire.

**Hepatita B** este o infecție virală care afectează ficatul și poate determina infecție pe durata întregii vieți. Posibile complicații: ciroză, cancer sau insuficiență hepatică.

**Hib** este o infecție bacteriană care determină inflamarea țesuturilor ce înconjoară creierul (meningită), infecția sângelui (septicemie), bronșită și otite.

Simptomele bolii: febră, vărsături, cefalee și redoarea cefei.

**Poliomielita** este o infecție virală care afectează sistemul nervos și poate determina paralizie.

**Tetanosul (trismus)** este o boală care cauzează spasme musculare dureroase și poate duce la convulsii și dificultăți de respirație. Este adeseori fatală.

**Tusea convulsivă** este o infecție bacteriană care determină o tuse iritativă ce se înrăutățește progresiv. Poate fi prezent un sunet de tuse caracteristic.

Posibile complicații: dificultăți severe de respirație, pneumonie, insuficiență cardiacă și respiratorie și leziuni cerebrale.

Toate cele prezentate mai sus sunt boli severe care pot duce la deces.

### Cine ar trebui să fie vaccinat cu vaccinul 6 în 1?

## 6 in 1 Information Leaflet - Romanian


Vaccinul 6 în 1 este administrat sugarilor la vârstele de 2 luni, 4 luni și 6 luni. Trebuie să vă duceți copilul la medicul dumneavoastră de familie (GP) pentru a primi gratis vaccinul.

### De ce vaccinul 6 în 1 în loc de 5 în 1?

Vaccinul 6 în 1 include toate vaccinurile din 5 în 1 precum și vaccinul antihepatită B.

În Irlanda, numărul cazurilor de hepatită B a crescut anual între 1996 și 2005. În ultimii ani, s-au raportat peste 800 de cazuri pe an (vezi diagrama).

Numărul de notificări de hepatită virală B între 1982-2006 (sursa: HPSC)



Includerea vaccinului antihepatită B în programul de imunizare îi va proteja pe copiii irlandezi la această vârstă dar și la vârste mai mari. Administrarea vaccinului la vârste mici reprezintă modalitatea cea mai eficientă pentru a preveni infecția cu virus hepatic B în populația generală.

### Cui nu ar trebui să i se administreze vaccinul 6 în 1?

Există foarte puține persoane cărora nu ar trebui să li se administreze vaccinul 6 în 1. Copilului dumneavoastră nu ar trebui să i se administreze vaccinul dacă a avut o reacție alergică adevărată (anafilactică) la o doză anterioară sau la orice particulă din vaccin.

### **La ce vă puteți aștepta după vaccinare**

Unii copii pot avea la locul injecției o zonă dureroasă, roșie sau inflamată. Pot fi irascibili și pot avea sindrom febril. Dacă apar astfel de manifestări puteți să le dați paracetamol sau ibuprofen pentru copii. Trebuie să le dați să bea multe lichide. Asigurați-vă că nu le este prea cald și că hainele nu se freacă de zona injectată.

### **Pentru mai multe informații**

- Contactați-l pe medicul dumneavoastră de familie sau pe asistenta de sănătate publică
- Procurați un exemplar din **Imunizările copilului dumneavoastră – Un ghid pentru părinți** disponibil la asistenta dumneavoastră de sănătate publică
- Vizitați [www.immunisation.ie](http://www.immunisation.ie) sau [www.hpsc.ie](http://www.hpsc.ie)

Publicat de: HSE National Immunisation Office (Oficiul Național de Imunizare al HSE)

Data publicării: Aprilie 2008

Codul de comandă: HNI00510