

## **Vacina 6 em 1**

### **Informações para os pais**

#### **O que é a vacina 6 em 1?**

A vacina 6 em 1 protege o seu bebé contra seis doenças: difteria, hepatite B, haemophilus influenzae tipo B (Hib), poliomielite, tétano e tosse convulsa.

#### **O que são estas doenças?**

**Difteria** é uma infecção bacteriana que provoca o desenvolvimento de uma membrana de pus no nariz, garganta ou vias respiratórias.

Sintomas: dor de garganta, febre, dor de cabeça e aceleração da frequência cardíaca.

Possíveis complicações: insuficiência cardíaca, paralisia, problemas respiratórios graves ou dificuldades em engolir.

**Hepatite B** é uma infecção viral que afecta o fígado e pode causar infecções para toda a vida. Possíveis complicações: cirrose, cancro ou falha do fígado.

**Hib** é uma infecção bacteriana que causa inflamação no cérebro (meningite), envenenamento do sangue (septicemia), bronquite e infecções nos ouvidos.

Sintomas: febre, vómitos, dor de cabeça e rigidez do pescoço.

**Poliomielite** é uma infecção viral que afecta o sistema nervoso e pode causar paralisia.

**Tétano ('trismo')** é uma doença que causa espasmos musculares dolorosos, convulsões e dificuldades respiratórias. Na maioria dos casos é fatal.

**Tosse convulsa** é uma infecção bacteriana que causa uma tosse irritante que piora gradualmente. Pode ser caracterizada por um som do tipo 'guincho'.

Possíveis complicações: dificuldades respiratórias graves, pneumonia, falha cardíaca e pulmonar e danos cerebrais.

Todos os distúrbios acima referidos são graves e podem conduzir à morte.

### Quem deve ser vacinado com a 6 em 1?


A vacinação 6 em 1 é administrada a bebés aos 2, 4 e 6 meses. Deverá levar o seu filho ao médico de família (GP) por forma a tomar a vacina gratuitamente.

### Porquê a 6 em 1 em vez da 5 em 1?

A 6 em 1 inclui todas as vacinas contidas na 5 em 1, assim como a vacina da hepatite B.

Na Irlanda, o número de casos de hepatite B aumentou todos os anos entre 1996 e 2005. Nos anos recentes, foram relatados mais de 800 casos todos os anos (consulte o gráfico).

Número de notificações de hepatite B viral de 1982-2006 (fonte: HPSC)



Incluir a vacina da hepatite B no programa de vacinação infantil irá proteger as crianças irlandesas agora e quando forem mais velhas. Administrar a vacina na tenra idade é a forma mais eficaz de prevenir a infecção da hepatite B na população em geral.

### Quem não deve tomar a 6 em 1?

São muito poucas as pessoas que não deveria tomar a 6 em 1. O seu filho não deverá tomar a vacina se tiver tido uma verdadeira reacção alérgica (anafilaxia) a uma dose ou qualquer parte de uma vacina anterior.

### **O que acontece após a vacina?**

Algumas crianças podem sentir desconforto, vermelhidão ou inchaço na zona onde foi administrada a injeção. Poderão ficar irritáveis e a temperatura subir. Se tal acontecer, poderá administrar-lhes paracetamol ou ibuprofeno infantil. Deverá dar-lhe também bastantes líquidos. Certifique-se de que não estão demasiado quentes e que as suas roupas não estão a friccionar a zona da injeção.

### **Para obter mais informações**

- Contacte o seu médico de família ou a enfermeira da saúde pública
- Peça a sua cópia do **A vacinação do seu filho – Um guia para pais** que pode obter junto da enfermeira da saúde pública
- Visite as páginas [www.immunisation.ie](http://www.immunisation.ie) ou [www.hpsc.ie](http://www.hpsc.ie)

Publicado pelo: HSE National Immunisation Office

Data de Publicação: Abril de 2008

Código de encomenda: HNI00510