

## **БЦЖ**

### **Информационная брошюра для родителей**

#### **Что такое БЦЖ?**

Вакцинация стимулирует способность иммунной системы защищать организм от туберкулеза. Она содержит ослабленную форму бактерии, вызывающей туберкулез. Вакцинация стимулирует способность иммунной системы защищать организм от туберкулеза.

Вакцина БЦЖ будет введена Вашему ребенку в верхнюю часть левой руки.

#### **Что такое туберкулез?**

Туберкулез — это бактериальная инфекция, которая может поражать любой орган, чаще всего легкие. Туберкулез передается при близком контакте с больным. Основные симптомы туберкулеза включают в себя кашель с мокротой, кровохарканье, потерю веса, лихорадку и повышенную потливость ночью. Каждый год в Ирландии приблизительно у 400 человек диагностируют туберкулез.

#### **Кого следует прививать?**

Мы рекомендуем проводить вакцинацию БЦЖ новорожденным. Детям до 16 лет, которые ранее не были привиты, также следует сделать эту прививку. Новорожденным вакцинацию БЦЖ могут провести в родильном доме, или Вы можете записать ребенка на прием в местном центре здоровья HSE. Детям постарше вакцинацию БЦЖ можно провести в местном центре здоровья HSE.



#### **Чего следует ожидать после вакцинации**

Через 3–6 недель после проведения вакцинации БЦЖ на месте инъекции обычно появляется маленькая красная папула. Эта папула сохраняется в течение нескольких недель, и при этом возможны незначительные выделения. На месте инъекции может появиться корочка. Это нормально. Корочка сойдет, оставив маленький шрам.

#### **Есть ли какие-либо побочные явления?**

Аллергические реакции на БЦЖ возникают редко.

- У немногих детей появляется припухлость подмышечных желез.

- У немногих детей развивается более серьезная реакция, например, глубокие язвы или появление нарыва. В таких случаях следует обращаться к своему семейному врачу или участковой медсестре.

#### **Несколько советов...**

- После проведения вакцинации Ваш ребенок может мыться, принимать душ, купаться и плавать, как обычно. Нет необходимости заклеивать место инъекции пластырем.
- В случае появления из папулы выделений необходимо наложить сухую повязку и регулярно ее менять.
- Не смазывайте папулу кремом, маслом или мазью, даже если есть выделения.
- Не надевайте обтягивающую место инъекции одежду.

Если у Вас есть вопросы, свяжитесь с местным центром здоровья HSE или участковой медсестрой.

#### **Что такое проба Манту?**

Проба Манту – это кожный тест, который показывает, подвергался ли организм воздействию туберкулезной инфекции. Мы рекомендуем делать ее детям шести лет и старше. Детям до 6 лет, которые подвергаются риску инфицирования туберкулезом, также следует делать эту пробу. При проведении теста в руку вводится инъекция. Результаты оценивают через 2–3 дня. Если результат отрицательный, может быть проведена вакцинация БЦЖ.

#### **Когда не следует проводить вакцинацию БЦЖ?**

Вакцинацию БЦЖ не следует проводить или следует отложить, если Ваш ребенок:

- нездоров, особенно при температуре выше 38 °С,
- живет с кем-то, кто болеет или является носителем туберкулеза,
- ВИЧ-положителен, или рожден ВИЧ-положительной матерью,
- проходит курс медикаментозного лечения, в частности, химиотерапии,
- принимает иммуносупрессорные препараты,
- в последние четыре недели был привит живой вакциной, например MMR,
- имел подтвержденную анафилактическую (аллергическую) реакцию на один из компонентов вакцины.

#### **Пожалуйста, сообщите доктору, если:**

- мать ребенка проходила длительное лечение во время беременности или кормления грудью;
- Вы или другой член Вашей семьи контактировал с человеком, который болел туберкулезом в течение последних пяти лет.

#### **Дополнительная информация**

Обратитесь в центр здоровья HSE или к Вашей участковой медсестре.

Посетите веб-сайты:

[www.immunisation.ie](http://www.immunisation.ie)

[www.hpsc.ie](http://www.hpsc.ie)