

## لقاح المكورات السحائية C معلومات للآباء

### ما هو مرض المكورات السحائية C؟

مرض المكورات السحائية C (Men C) هو مرض خطير ينتج عن نوع من البكتيريا يطلق عليه النيسيرية السحائية من السلالة المصلية C. تتضمن أعراض مرض المكورات السحائية C الحمى وتيبس الرقبة والصداع وآلام المفاصل والطفح الجلدي.

### كيف ينتشر مرض المكورات السحائية C؟

مرض المكورات السحائية C هو مرض معد. وتعيش البكتيريا المسببة له في أنف وحلق الإنسان. وينتقل المرض عبر الهواء من خلال شخص يحمل هذه البكتيريا وذلك عن طريق السعال أو العطس أو حتى التنفس.

### ما هي الأمراض التي يسببها؟

من الممكن أن يتسبب مرض المكورات السحائية C في أمراض خطيرة، منها:  
التهاب السحايا (التهاب الغشاء الذي يحيط بالمخ)  
الإنتان الدموي (تسمم الدم)

### من الأكثر عرضة للإصابة؟

مرض المكورات السحائية C يكون أكثر شيوعاً بين الأطفال الأقل من خمسة أعوام. ويعتبر الأطفال الأقل من عام واحد أكثر عرضة للمرض بصفة خاصة. كما يشيع المرض أيضاً بين المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 19 عاماً.

### هل يوجد لقاح ضد مرض المكورات السحائية C؟

منذ عام 2000 تم إضافة لقاح المكورات السحائية C إلى برنامج تطعيمات الأطفال. الأطفال الذين سيولدون في الأول من يوليو 2008 أو بعد هذا التاريخ ينبغي أن يتلقوا لقاح المكورات السحائية C في نفس الوقت مع اللقاحات الأخرى في سن 4 و 6 و 13 شهراً.

### هل التطعيم بأكثر من لقاح في نفس الوقت يعد مسألة آمنة؟

لا توجد خطورة من ذلك. فمواعيد إعطاء اللقاحات محددة بحيث تمنح طفلك أفضل وقاية.

### هل يحتاج طفلي إلى جرعة تنشيطية ضد مرض المكورات السحائية C؟

لمزيد من الحماية ضد الإصابة بمرض المكورات السحائية C ينبغي أن يتلقى طفلك جرعة تنشيطية من لقاح المكورات السحائية C في نفس الوقت مع لقاح الأنفلونزا البكتيرية Hib في سن 13 شهراً.

### ما هو المتوقع حدوثه بعد أخذ اللقاح؟

قد يصاب بعض الأطفال بالقلق أو الاحمرار أو التورم بعد حقنهم. وقد يكونون عصبيين بعض الشيء ويصابوا بارتفاع درجة الحرارة. فإذا حدث هذا يمكنك إعطاؤهم باراسيتامول أو إيبوبروفين الخاصين بالأطفال. يجب أن تجعلهم يشربون كمية كبيرة من المشروبات. احرص على ألا ترتفع درجة حرارتهم بشكل كبير، وتأكد أن ملابسهم لا تحتك بمكان الحقنة.

### من الذي ينبغي ألا يتلقى لقاح المكورات السحائية C؟

هناك قلة من الأشخاص ينبغي ألا يتم تطعيمهم بلقاح المكورات السحائية C. ينبغي ألا يأخذ طفلك اللقاح إذا كانت لديه حساسية حقيقية (العوار) ضد جرعة سابقة أو حساسية لأحد مكونات اللقاح.

لقاح المكورات السحائية C يقي فقط من التهاب السحايا والإنتان الدموي الناتجين عن مرض المكورات السحائية C. ولكن هناك أنواع أخرى من الأمراض يسببها مرض الأنفلونزا البكتيرية Hib، ويتعين عليك معرفة الأعراض المرتبطة بها حتى يمكنك تمييزها. ومن هذه الأعراض:

الحمى

رفض الطعام

جلد شاحب أو مبرقش، أو به بقع أو طفح جلدي

خمول أو صعوبة في الاستيقاظ.

إذا ساورك القلق بخصوص حالة طفلك، فاتصل بطبيب العائلة على الفور.

**للمزيد من المعلومات**

اتصل بطبيب العائلة أو مرشد صحي عام

حصل على نسخة من دليل تطعيمات طفلك – دليل للأبوين من المرشد الصحي العام

تفضل بزيارة موقعي الإنترنت [www.immunisation.ie](http://www.immunisation.ie) أو [www.hpsc.ie](http://www.hpsc.ie)

الناشر: المكتب القومي للصحة والسلامة HSE

تاريخ النشر: أبريل 2008

كود الطلب: HNI00511