

C群脑膜炎菌荚膜多糖结合疫苗 告家长书

什么是C群脑膜炎球菌病？

C群脑膜炎球菌病 (Men C) 是由一种称为C群脑膜炎奈瑟菌的细菌所导致的严重疾病。Men C疾病的症状包括发烧、颈强直、头痛、关节疼痛和皮疹。

Men C疾病是如何传播的？

Men C是一种传染性疾病。这种细菌滋生在人的鼻部和喉部。该疾病是通过携带这种细菌的人咳嗽、打喷嚏或甚至通过呼吸借空气传播。

它会导致哪些疾病？

Men C可导致严重的疾病，包括：

- 脑膜炎 (脑膜发炎)
- 败血症 (血液中毒)

哪些人最易受感染？

Men C在五岁以下的儿童中最为常见。尤其对一岁以下的婴儿风险最大。在15-19岁的青少年中也很常见。

有抵抗Men C的疫苗吗？

自从2000年以来，Men C疫苗已被纳入儿童免疫计划。在2008年7月1日当天或以后出生的婴儿应在其4个月、6个月和13个月大时与其他疫苗一起同时接种Men C疫苗。

同时接种一种以上的疫苗安全吗？

是的，这是安全的。为您的婴儿定期接种疫苗，为他们提供最好的保护。

我的孩子需要接种Men C加强疫苗吗？

为了更好地保护儿童免受Men C感染，在其13个月接种Hib疫苗时应同时接种Men C加强疫苗。

接种疫苗后会出现什么情况？

有些儿童会感觉注射部位不舒服、发红或肿胀。他们可能会出现心情烦躁和体温升高的症状。如果出现这些情况，您可以给他们服用儿童装扑热息痛或布洛芬。同时您需要给他们喝大量的水。请确保不要让孩子穿得过热，并且不要让衣物摩擦到注射区域。

哪些人不能接种Men C疫苗？

几乎人人都能接种Men C疫苗。如果您的孩子对先前的疫苗接种剂量或疫苗的任何部分有过过敏反应，那么您的孩子将不能接种这种疫苗。

Men C疫苗仅用于抵抗因C群脑膜炎球菌病感染而导致的Men C脑膜炎和败血症。这种疾病还有其他很多类型，因此您需要了解需要密切注意的症状。这些症状包括：

Men C - Simplified Chinese

- 发烧
- 厌食
- 皮肤苍白或有水泡、斑点或皮疹
- 困倦或睡不醒。

如果您对孩子的情况很担心，请立即联系您的家庭医生。

更多信息

- 请与您的家庭医生或社区护士联系
- 从您的社区护士处索取**您孩子的免疫法 – 家长指南** 副本
- 访问www.immunisation.ie或www.hpsc.ie

出版：HSE国家疫苗接种办公室

出版日期：2008年4月

订购编号：HNI00511