

## **Meningokokken C-Impfung Informationen für Eltern**

### **Was ist Meningokokken C?**

Meningokokken C (Men C) ist eine ernsthafte Erkrankung, die durch ein Bakterium namens Neisseria Meningitidis Serogruppe C verursacht wird. Zu den Symptomen der Men C-Erkrankung gehören Fieber, ein steifer Nacken, Kopfschmerzen, Gelenkschmerzen und Ausschlag.

### **Wie wird die Men C-Erkrankung verbreitet?**

Men C ist eine ansteckende Krankheit. Die Bakterien leben in der Nase und im Rachen von Menschen. Die Krankheit verbreitet sich durch die Luft, indem die Person, die die Bakterien trägt, hustet, niest oder sogar nur atmet.

### **Welche Krankheiten verursacht es?**

Men C kann ernsthafte Erkrankungen verursachen, einschließlich:

- Meningitis (Entzündung der Hirnhaut)
- Sepsis (Blutvergiftung)

### **Wer ist am meisten gefährdet?**

Men C tritt am häufigsten bei Kindern unter fünf Jahren auf. Babys unter einem Jahr sind besonders gefährdet. Sie tritt auch häufig bei Jugendlichen im Alter von 15-19 Jahren auf.

### **Gibt es einen Impfstoff gegen Men C?**

Seit 2000 wird die Men C-Impfung im Rahmen des routinemäßigen Immunisierungsprogramms allen Kindern angeboten. Babys, die am oder nach dem 1. Juli 2008 geboren sind, sollten die Men C-Impfung zusammen mit ihren anderen Impfungen im Alter von 4, 6 und 13 Monaten erhalten.

### **Ist es sicher, gleichzeitig mehrere Impfungen zu erhalten?**

Ja, dies ist sicher. Die Impfstoffe sind so entwickelt, dass sie Ihrem Baby den besten Schutz bieten.

### **Benötigt mein Kind eine zusätzliche Men C-Dosis?**

Um Ihrem Kind einen zusätzlichen Schutz gegen die Men C-Infektion zu geben, sollte es die zusätzliche Dosis zur selben Zeit wie die Hib-Impfung im Alter von 13 Monaten erhalten.

### **Was ist nach der Impfung zu erwarten**

Einige Kinder können Unwohlsein, Rötungen oder Schwellungen an den Stellen aufweisen, an denen die Impfung verabreicht wurde. Ihr Kind ist möglicherweise leicht erregbar und kann eine erhöhte Temperatur haben. Wenn dies der Fall ist, verabreichen Sie ihm Paracetamol oder Ibuprofen. Außerdem sollte Ihr Kind viel trinken. Stellen Sie sicher, dass Ihrem Kind nicht zu warm ist und dass seine Kleidung nicht gegen den Injektionsbereich reibt.

### **Wer sollte die Men C-Impfung erhalten?**

## Men C - German

Es gibt sehr wenige Personen, für die der Men C-Impfstoff nicht geeignet ist. Ihr Kind sollte den Impfstoff nicht erhalten, wenn es auf einen zuvor verabreichten Impfstoff oder einen Bestandteil eines Impfstoffes eine echte allergische Reaktion (Anaphylaxe) gezeigt hat.

Die Men C-Impfung schützt nur gegen Men C-Meningitis und Septikämie, die durch die Meningokokken C-Infektion verursacht werden. Es gibt andere Arten dieser Erkrankungen, Sie müssen daher wissen, auf welche Symptome Sie achten müssen. Es gibt folgende Symptome:

- Fieber
- Nahrungsverweigerung
- Blasse oder fleckige Haut, Pickelchen oder Ausschlag
- Schläfrigkeit oder Schwierigkeiten beim Aufwachen.

Wenn Sie um Ihr Baby Sorgen machen, rufen Sie sofort Ihren Hausarzt an.

### **Für weitere Informationen**

- o wenden Sie sich an Ihren Hausarzt oder an das Gesundheitsamt
- o beschaffen Sie sich ein Exemplar von **Die Immunisierung Ihres Kindes – Ein Leitfaden für Eltern** vom Gesundheitsamt
- o besuchen Sie [www.immunisation.ie](http://www.immunisation.ie) oder [www.hpsc.ie](http://www.hpsc.ie)

Veröffentlicht von: HSE National Immunisation Office

Veröffentlichungsdatum: April 2008

Bestellcode: HNI00511