

Vacina Meningocócica C

Informações para os pais

O que é a meningocócica C?

Meningocócica C (Men C) é uma doença grave causada por uma bactéria denominada por neisseria meningitidis serogrupo C. Os sintomas da doença Men C incluem febre, rigidez do pescoço, cefaleia, dores nas articulações e erupção cutânea.

Como é que a doença Men C se transmite?

A Men C é uma doença contagiosa. A bactéria habita no nariz e na garganta dos humanos. A doença transmite-se através do ar por uma pessoas que transporta a bactéria ao tossir, espirrar ou mesmo respirar.

Quais são os distúrbios que provoca?

A Men C pode causar doenças graves incluindo:

- Meningite (inflamação das membranas que envolvem o cérebro)
- Septicemia (envenenamento do sangue)

Quem é que corre mais riscos?

A doença Men C é mais comum nas crianças com menos de cinco anos. Bebés com menos de um ano estão sujeitos a um risco maior. Também é comum em adolescentes entre os 15-19 anos.

Existe alguma vacina contra a Men C?

Desde 2000, que a vacina Men C tem sido incluída no programa de vacinação infantil. Bebés nascidos depois de 1 de Julho de 2008 devem tomar a vacina Men C em simultâneo com outras vacinas aos 4, 6 e 13 meses.

É seguro tomar mais do que uma vacina ao mesmo tempo?

Sim, é seguro. As vacinas estão previstas para fornecer ao seu bebé a melhor protecção.

O meu filho necessita de um reforço da Men C?

Para ter um protecção extra contra a infecção Men C, o seu filho deve receber o reforço da Men C ao mesmo tempo que tomar a vacina Hib aos 13 meses de idade.

O que acontece após a vacina?

Algumas crianças podem sentir desconforto, vermelhidão ou inchaço na zona onde foi administrada a injeção. Poderão ficar irritáveis e a temperatura subir. Se tal acontecer, poderá administrar-lhes paracetamol ou ibuprofeno infantil. Deverá dar-lhe também bastantes líquidos. Certifique-se de que não estão demasiado quentes e que as suas roupas não estão a friccionar a zona da injeção.

Quem é que não deve tomar a vacina Men C?

São muito poucas as pessoas que não podem tomar a vacina Men C. O seu filho não deverá tomar

Men C - Portuguese

a vacina se tiver tido uma verdadeira reacção alérgica (anafilaxia) a uma dose ou qualquer parte de uma vacina anterior.

A vacina Men C apenas protege contra a meningite Men C e a septicemia causada pela infecção meningocócica C. Existem outros tipos de doenças, pelo que terá de conhecer os sintomas para as reconhecer. As mesmas podem incluir:

- Febre
- Recusar comida
- Pela pálida ou manchada, borbulhas ou uma erupção cutânea
- Moleza ou dificuldades em andar

No caso de estar preocupado com o seu bebé, contacte imediatamente o seu médico de família.

Para obter mais informações

- o Contacte o seu médico de família ou a enfermeira da saúde pública
- o Peça a sua cópia do **A vacinação do seu filho – Um guia para pais** que pode obter junto da enfermeira da saúde pública
- o Visite as páginas www.immunisation.ie ou www.hpsc.ie

Publicado pelo: HSE National Immunisation Office

Data de Publicação: Abril de 2008

Código de encomenda: HNI00511