

## Vaccinul antimeningococic C Informații pentru părinți

### Ce este meningococemia C?

Meningococemia C (Men C) este o boală severă determinată de bacteria numită neisseria meningitidis de serogrup C. Simptomele bolii Men C includ febră, redoarea cefei, cefalee, dureri articulare și erupții cutanate.

### Cum se transmite Men C?

Men C este o boală contagioasă. Bacteria se găsește în nasul și gâtul oamenilor. Boala se transmite prin aer de către o persoană purtătoare a bacteriei - prin tuse, strănut sau chiar respirație.

### Ce boli produce această bacterie?

Men C poate produce boli severe care includ:

- Meningită (inflamarea țesuturilor care înconjoară creierul)
- Septicemie (infecția sângelui)

### Care sunt persoanele cele mai expuse la risc?

Boala Men C este cea mai frecventă la copiii cu vârsta sub 5 ani. Sunt expuși riscului mai ales copiii cu vârsta sub 1 an. Este de asemenea frecventă la adolescenții cu vârste între 15-19 ani.

### Există un vaccin împotriva Men C?

Din anul 2000, vaccinul anti-Men C a fost inclus în programul de imunizare a copiilor. Copiii născuți pe sau după 1 iulie 2008 ar trebui să primească vaccinul anti-Men C în același timp cu celelalte vaccinuri la vârstele de 4, 6 și 13 luni.

### Este sigur să fie administrat mai mult de un vaccin în același timp?

Da, este sigur. Vaccinurile sunt programate să îi asigure copilului dumneavoastră cea mai bună protecție.

### Copilul meu are nevoie de un vaccin anti-MenC?

Pentru a asigura o protecție suplimentară împotriva infecției cu MenC copilul dumneavoastră ar trebui să primească o doză de vaccin anti-MenC în același timp cu vaccinul Hib la vârsta de 13 luni.

### La ce vă puteți aștepta după vaccinare

Unii copii pot avea la locul injecției o zonă dureroasă, roșie sau inflamată. Pot fi irascibili și pot avea sindrom febril. Dacă apar astfel de manifestări puteți să le dați paracetamol sau ibuprofen pentru copii. Trebuie să le dați să bea multe lichide. Asigurați-vă că nu le este prea cald și că hainele nu se freacă de zona injectată.

### Cui nu ar trebui să i se administreze vaccinul anti-Men C?

Există foarte puține persoane cărora nu ar trebui să li se administreze vaccinul anti-MenC. Copilului

## Men C - Romanian

dumneavoastră nu ar trebui să i se administreze vaccinul dacă a avut o reacție alergică adevărată (anafilactică) la o doză anterioară sau la orice particulă din vaccin.

Vaccinul anti-MenC protejează doar împotriva meningitei MenC și septicemiei determinate de infecția cu meningococ C. Există și alte tipuri de astfel de boli, astfel că trebuie să știți ce simptome să căutați. Acestea pot include:

- Febră
- Refuzul hranei
- Tegument palid, cu pete sau iritații
- Amețeli sau dificultăți la trezire.

Dacă vă îngrijorează starea copilului dumneavoastră, contactați-l imediat pe medicul dumneavoastră de familie.

### **Pentru mai multe informații**

- o Contactați-l pe medicul dumneavoastră de familie sau pe asistenta de sănătate publică
- o Procurați un exemplar din **Imunizările copilului dumneavoastră – Un ghid pentru părinți** disponibil la asistenta dumneavoastră de sănătate publică
- o Vizitați [www.immunisation.ie](http://www.immunisation.ie) sau [www.hpsc.ie](http://www.hpsc.ie)

Publicat de: HSE National Immunisation Office (Oficiul Național de Imunizare al HSE)

Data publicării: Aprilie 2008

Codul de comandă: HNI00511