

نشرة حقائق لقاح أنفلونزا الخنازير

نشرك على حضورك للتطعيم بلقاح أنفلونزا الخنازير

ما هي أنفلونزا الخنازير؟

أنفلونزا الخنازير هي نوع من فيروسات الأنفلونزا الجديدة التي تسبب اعتلالا عند أغلب الناس تتراوح درجته بين الخفة والاعتدال. وهذا الفيروس هو المسبب لوباء الأنفلونزا الحالي. لقاح أنفلونزا الخنازير هو أفضل وسيلة لمنع انتشار هذا المرض.

كيف يعمل لقاح أنفلونزا الخنازير؟

يساعد اللقاح نظام المناعة الخاص بك على إنتاج أجسام مضادة لفيروس أنفلونزا الخنازير. إذا ما هاجم فيروس أنفلونزا الخنازير شخصا تم تطعيمه، فإن هذه الأجسام المضادة تهاجم الفيروس وتساعد على عدم إصابتك بالأنفلونزا.

إلى أي مدى يعتبر لقاح أنفلونزا الخنازير آمنا؟

نتوقع للقاح أنفلونزا الخنازير أن يكون على نفس مستوى الأمان الخاص بلقاح الأنفلونزا الموسمية المستخدم منذ ٦٠ عاما. كما يتوقع أن تكون الأعراض الجانبية الخطيرة نادرة الحدوث إلى حد بعيد كما أنه من غير الممكن أن يتسبب لقاح أنفلونزا الخنازير في إصابتك بأنفلونزا الخنازير. اللقاحات مرخصة بشكل كامل ومختبرة طبيا. يمكنك قراءة المزيد من المعلومات عن مدى أمان اللقاح على موقع الإنترنت swineflu.ie.

هل تطعيم المرأة الحامل آمن؟

نعم، اللقاح آمن للاستخدام في فترة الحمل وننصح كافة النساء الحوامل باستخدامه بدءا من الأسبوع الرابع عشر للحمل حتى الأسبوع السادس بعد الولادة. كما ينصح النساء الحوامل قبل الأسبوع الرابع عشر بالتطعيم بهذا اللقاح في حالة وجود خطورة عليهم من الناحية الصحية.

هل يمكن للقاح أنفلونزا الخنازير أن يتسبب في الإصابة بالأنفلونزا؟

لا. يحتوي لقاح أنفلونزا الخنازير على فيروس ميت، لذا لا يمكنه أن يتسبب في الإصابة بأنفلونزا الخنازير.

هل هناك أشخاص لا ينبغي تطعيمهم بلقاح أنفلونزا الخنازير؟

لا ينبغي تطعيم الأطفال الأقل من ٦ أشهر بلقاح أنفلونزا الخنازير

ينبغي تطعيم جميع الأشخاص الذين يزيد عمرهم على ٦ أشهر بلقاح إلا إذا

- كانت لديهم حساسية شديدة (تشكل خطرا على حياتهم) للبيض أو للمكونات الأخرى للقاح
- أصيبوا في السابق بالتهاب الجذور والأعصاب الحاد جيّان-باريه

استشر أحد أفراد طاقم المستشفى المقدمة للقاح لمعرفة ما إذا كانت لديك شكوك بهذا الصدد.

متى يجب تأجيل التطعيم بلقاح؟

ينبغي عدم أخذ اللقاح في حالة ارتفاع درجة حرارتك عن ٣٨ ° م

ما المدة التي يحتاجها اللقاح حتى يبدأ تأثيره؟

يبدأ تأثير اللقاح خلال أسبوعين – وننصحك إن أردت أن تكون بمأمن تام من أنفلونزا الخنازير بأخذ جرعة أخرى من اللقاح بعد الجرعة الأولى بثلاثة أسابيع.

أنفلوانزا الخنازير – أنت بمأمن الآن

أين يعطى لقاح أنفلوانزا الخنازير؟

يعطى لقاح أنفلوانزا الخنازير في الكتف. والأطفال الأقل من ثلاثة أعوام يتم حقنهم باللقاح في الفخذ.

ما هو المتوقع حدوثه بعد أخذ اللقاح مباشرة؟

تعتبر الأعراض الجانبية الشائعة بسيطة، وقد تشمل الألم أو احمرار أو تورم الموضع الذي تم حقن اللقاح فيه. وقد يحدث صداع وحمى وآلم خفيف متواصل وإرهاق. قد يصاب بعض الناس برشح ورعشة خفيفة نتيجة لرد فعل نظام المناعة الخاص بهم تجاه اللقاح، إلا أن هذا لا يعتبر بأي حال دليل على الإصابة بأنفلوانزا الخنازير، حيث تزول تلك الأعراض بعد مرور يوم تقريبا.

ماذا تفعل إذا شعرت بعدم الارتياح بعد أخذ اللقاح؟

تناول عقار الباراسيتامول أو إيبوبروفين في حالة وجود حمى أو آلم في موضع حقن اللقاح. تجنب احتكاك الملابس بمنطقة حقن اللقاح واشرب كمية كبيرة من السوائل. تذكر أنه قد يكون شعورك أو شعور الطفل بعدم الارتياح بعد أخذ اللقاح راجع لسبب آخر – لا تفترض أن ذلك راجع للقاح أنفلوانزا الخنازير، استعن بالمشورة الطبية عند الحاجة.

كيف تبلغ عن حدوث أحد الأعراض الجانبية؟

نظر لأن هذا اللقاح جديد فإن هيئة الدواء الأيرلندية ترغب في التعرف على أية أعراض جانبية مرتبطة باللقاح – يمكنك الإبلاغ عن ذلك عن طريق ملء النموذج الموجود في موقع الإنترنت www.imb.ie

هل ينبغي أن أرفع مقابل اللقاح؟

يقدم اللقاح والأعمال الإدارية المرتبطة به مجانا للجميع. قد يطلب منك تقديم رقم PPSN (رقم الخدمة العامة الشخصي) عند تطعيمك باللقاح.

للمزيد من المعلومات تفضل بزيارة موقع الإنترنت www.swineflu.ie أو اتصل بالرقم 1800 94 11 00

بمن اتصل في حالة حدوث مشكلة؟

في حالة ظهور أعراض جانبية خطيرة عليك أو على طفلك نتيجة لأخذ اللقاح ينبغي الاتصال بالممارس العام الذي تتعامل معه لاستشارته.

المزيد من المعلومات

تفضل بزيارة مواقع الإنترنت

www.swineflu.ie

www.immunisation.ie

www.hpsc.ie