

لقاح التيتانوس والدفتيريا معلومات للآباء

ما هو التيتانوس والدفتيريا؟

الدفتيريا هو مرض بكتيري معدي قد يؤدي لتكون غشاء سميك في الأنف أو الحلق أو مجرى الهواء. الأعراض: التهاب الحلق وارتفاع درجة الحرارة وصداع وسرعة معدل ضربات القلب. المضاعفات المحتملة: فشل القلب أو الشلل أو مشاكل كبيرة في التنفس أو صعوبة في التنفس.

التيتانوس («الفك المغلق») هو مرض يسبب تشنجات عضلية مؤلمة للغاية. المضاعفات المحتملة: أزمات وصعوبة في التنفس. وهو مرض خطير في أغلب الأحوال.

هل يوجد لقاح؟

لقاح **Td** (لقاح التيتانوس والدفتيريا) عبارة عن جرعة منشطة لحماية طفلك من أمراض التيتانوس والدفتيريا. حيث يعمل اللقاح على تحفيز الجهاز المناعي لتكوين الأجسام المضادة لهذه الأمراض.

من الذين يحتاجون إلى لقاح Td؟

يتم إعطاء لقاح Td للأطفال من سن 11 إلى 14 عاماً. كما يتم إعطائهم لقاحي التيتانوس والدفتيريا كجزء من لقاحات 5 في 1 أو 4 في 1. إذا لم تكن متأكدًا ما اللقاحات التي تم إعطاؤها لطفلك، فاطلب من طبيب العائلة (الممارس العام) أو من المرشد الصحي العام مراجعة سجل التطعيمات.

من الذي يقوم بإعطاء اللقاح؟

يُقدم اللقاح كجزء من برنامج التطعيم المدرسي. ستقوم الهيئة التنفيذية للخدمات الصحية (HSE) بإرسال خطابا واستمارة موافقة إليك من خلال مدرسة طفلك.

في مقاطعات Cavan «كافان» و Donegal «دونيجال» و Leitrim «لايتريم» و Sligo «سليجو» و Monaghan «موناجان» و Meath «ميث» و Louth «لوث» وأجزاء من North Dublin «شمال دبلن» قد لا يُقدم لقاح Td ضمن برنامج التطعيم المدرسي التابع لهيئة HSE. وفي هذه الحالة ستقوم هيئة HSE بإرسال خطاب تتطلب منك فيه إحضار طفلك إلى الممارس العام الذي تتعامل معه عند حلول موعد التطعيم.

ماذا يحدث لو تغيب طفلي عن يوم التطعيم المدرسي؟

سيظل بإمكانهم أخذ اللقاح. حيث ستقوم هيئة HSE إما بترتيب موعد لك لتصطحب طفلك إلى عيادة خاصة أو ستطلب منك إحضاره إلى الممارس العام لتطعيمه.

ما هو المتوقع حدوثه بعد أخذ اللقاح؟

من النادر جدا رؤية آثار جانبية عقب التطعيم بلقاح Td. قد يصاب طفلك بألم أو تورم أو احمرار حول مكان الحقنة. وقد يكون عصبيا بعض الشيء أو يصاب بالحُمى. فإذا حدث هذا يمكنك إعطاؤه باراسيتامول أو إيبوبروفين. يجب أن تجعله يشرب كمية كبيرة من المشروبات. احرص على ألا ترتفع درجة حرارته بشكل كبير، وتأكد أن ملابسه لا تحتك بمكان الحقنة.

من الذي ينبغي ألا يأخذ لقاح Td؟

يعد لقاح Td لقاحا آمنا للغاية. ولكن هناك بعض الأسباب التي تمنع أخذ اللقاح. لذلك يجب أن تُؤجل إعطاء اللقاح لطفلك إذا كان: مرض لتأثيرات حساسية خطيرة بعد الجرعة السابقة من اللقاح.

ة حرارته أعلى من 38°م أو 100°ف، ما لم يكن قد تعرض لجرح قد يكون ملوثا بالتيتانوس.

للمزيد من المعلومات

يرجى الاتصال بفريق التطعيم المدرسي أو الممارس العام أو الممرضة الممارسة
حصل على نسخة من دليل تطعيمات طفلك - دليل للأبوين من المرشد الصحي العام

تفضل بزيارة موقعي الإنترنت www.immunisation.ie أو www.hpsc.ie

الناشر: المكتب القومي للصحة والسلامة HSE

تاريخ النشر: أكتوبر 2007

كود الطلب: HPM00483