

破伤风和白喉疫苗 告家长书

什么是破伤风和白喉？

白喉是一种细菌性疾病，具有传染性，会导致鼻部、喉部或气管内出现一层伪膜。

症状：咽喉肿胀、发烧、头痛和心率加快。

可能的并发症：心力衰竭、瘫痪、呼吸急促或呼吸困难。

破伤风（“牙关紧闭症”）是一种会引起严重肌肉痉挛的疾病，使人倍感疼痛。

可能的并发症：呼吸时伴有痉挛和呼吸困难。破伤风通常是致命的。

有疫苗吗？

Td疫苗是一种加强疫苗，可以防止您的孩子感染破伤风和白喉。这种疫苗的作用原理是激发他们的免疫系统以建立抵抗这些疾病的保护机制。

哪些人需要接种Td疫苗？

Td疫苗的接种对象是11岁至14岁的儿童。破伤风和白喉疫苗通常作为五合一或四合一疫苗的组成部分进行接种。如果您不确定您的孩子已经接种了哪些疫苗，可以要求您的家庭医生（GP）或社区护士查看您孩子的疫苗接种记录。

由哪些机构提供该疫苗？

该疫苗通常作为学校疫苗计划的组成部分来提供。健康服务管理署（HSE）将通过您孩子所在的学校为您邮寄一封信函和一份同意书。

在Cavan（卡文郡）、Donegal（多尼戈尔郡）、Leitrim（利特里姆郡）、Sligo（斯莱戈郡）、Monaghan（莫纳亨郡）、Meath（米斯郡）、Louth（劳斯郡）以及部分北都柏林地区，您的HSE学校疫苗接种计划可能不提供Td疫苗。这种情况下，HSE将为您邮寄一封信函，通知您在疫苗到位时带孩子到您的GP处进行接种。

如果错过学校疫苗接种日怎么办？

您的孩子仍然可以接种该疫苗。HSE将安排您的孩子到指定的诊所接受疫苗接种，或者通知您带孩子到您的GP处进行接种。

接种疫苗后会出现什么情况？

Td疫苗在接种后几乎没有副作用。在您孩子的疫苗注射处，可能出现轻微疼痛、肿胀和发红现象。他们可能会出现心情烦躁和发热的症状。如果出现这些情况，您可以给他们服用扑热息痛和布洛芬。同时您需要给他们喝大量的水。请确保不要让孩子穿得过热，并且不要让衣物摩擦到注射区域。

哪些人不能接种Td疫苗？

Td疫苗非常安全。几乎人人都可以接种。在下列情形下，您必须推迟接种疫苗：

- 您的孩子对以前接种过的疫苗剂量有严重的过敏反应。

Td - Simplified Chinese

- 您的孩子发烧超过38°C或100°F，但如果他们身上有容易感染破伤风的伤口，则应立即接种疫苗。

更多信息

- 联络您的学校疫苗接种小组、您的GP或执业护士。
- 从您的社区护士处索取您孩子的免疫法 – 家长指南 副本
- 访问www.immunisation.ie或www.hpsc.ie

出版：HSE国家疫苗接种办公室

出版日期：2007年10月

订购编号：HPM00483