

## **Vaccin contre le tétanos et la diphtérie**

### **Informations pour les parents**

#### **Que sont le tétanos et la diphtérie ?**

**La diphtérie** est une maladie contagieuse qui peut provoquer un encombrement du nez, de la gorge ou des voies aériennes.

Symptômes : maux de gorge, température élevée, migraines et accélération du rythme cardiaque.

Complications éventuelles : insuffisance cardiaque, paralysie, problèmes respiratoires graves ou difficultés à respirer.

**Le tétanos** (ou « trismus ») est une maladie qui provoque des spasmes musculaires douloureux.

Complications éventuelles : crises et difficultés respiratoires. Cette maladie est souvent fatale.

#### **Existe-t-il un vaccin ?**

Le vaccin **Td** est une injection de rappel qui protège votre enfant contre le tétanos et la diphtérie. Le vaccin opère en stimulant le système immunitaire pour fabriquer une défense contre ces maladies.

#### **À qui est destiné le vaccin Td ?**

Le vaccin Td est administré aux enfants âgés de 11 à 14 ans. Les vaccins contre le tétanos et la diphtérie sont également inclus dans le vaccin 5 en 1 ou 4 en 1. Si vous n'êtes pas sûr(e) des vaccins que votre enfant a reçus, demandez à votre médecin généraliste ou à une infirmière de la santé publique de vérifier dans leurs dossiers de vaccination.

#### **Qui administre le vaccin ?**

Les enfants sont généralement vaccinés dans le cadre de la campagne de vaccination scolaire. Le Health Service Executive (HSE) vous adressera un courrier ainsi qu'un formulaire de consentement par l'intermédiaire de l'école de votre enfant.

Dans les comtés de Cavan, Donegal, Leitrim, Sligo, Monaghan, Meath, Louth ainsi que dans certains secteurs de North Dublin, il est possible que la campagne de vaccination scolaire de votre HSE ne propose pas le vaccin Td. Dans ce cas, le HSE vous enverra un courrier vous demandant d'emmener votre enfant chez votre médecin généraliste lorsque le vaccin devra être administré.

#### **Que se passe-t-il si mon enfant est absent le jour de la vaccination à l'école ?**

Ils peuvent encore être vaccinés. Le HSE prendra les dispositions nécessaires pour que votre enfant soit vacciné dans une clinique spéciale ou bien vous demandera d'emmener votre enfant chez votre médecin généraliste pour le faire vacciner.

#### **Quels symptômes peuvent se manifester après la vaccination ?**

Les effets secondaires du vaccin Td sont extrêmement rares. Chez certains enfants, le site d'injection peut être douloureux, rouge ou boursoufflé. Votre enfant peut être irritable et avoir de la

fièvre. Dans ce cas, vous pouvez lui administrer du paracétamol ou de l'ibuprofène. Il doit également boire beaucoup. Assurez-vous qu'il n'a pas trop chaud et que ses vêtements ne frottent pas le site d'injection.

### **Quels sont les enfants qui ne doivent pas recevoir le vaccin Td ?**

Le vaccin Td est un vaccin très sûr. Il existe quelques raisons de ne pas l'administrer. Il est recommandé de reporter la vaccination si :

- votre enfant a fait auparavant une réaction allergique grave à une injection précédente du vaccin,
- votre enfant a plus de 38 °C (100 °F) de fièvre, sauf s'il présente une blessure susceptible de développer une infection au tétanos.

### **Pour obtenir de plus amples informations :**

- contactez votre équipe de vaccination en milieu scolaire, votre médecin généraliste ou un cabinet infirmier ;
- demandez la brochure « **Your child's immunisations – A guide for parents** » (« **L'immunisation de mon enfant - un guide destiné aux parents** ») à votre infirmière de la santé publique ;
- consultez le site [www.immunisation.ie](http://www.immunisation.ie) ou [www.hpsc.ie](http://www.hpsc.ie)

Publié par : HSE National Immunisation Office

Date de publication : octobre 2007

Code de commande : HPM00483