

Szczepionka przeciwko tężcowi oraz błonicy Informacje dla rodziców

Czym charakteryzuje się tężec i błonica?

Błonica to zakaźna choroba bakteryjna, która może powodować naloty w nosie, gardle lub drogach oddechowych.

Objawy: ból gardła, wysoka gorączka, ból głowy i szybkie bicie serca.

Możliwe powikłania: choroby serca, paraliż, poważne problemy z układem oddechowym lub trudności w oddychaniu.

Tężec (szczękościsk) to choroba, która powoduje poważne i bolesne skurcze mięśni.

Możliwe powikłania: omdlenia i trudności w oddychaniu. W przypadku tej choroby, śmiertelność jest duża.

Czy istnieje szczepionka przeciw tężcowi?

Td to szczepionka wzmacniająca, która chroni dziecko przed zachorowaniem na tężec i błonicę.

Szczepionka działa stymulując system immunologiczny w celu wzmocnienia odporności na te choroby.

Komu należy podawać szczepionkę Td?

Szczepionka Td jest podawana dzieciom pomiędzy 11. a 14. rokiem życia. Szczepionki przeciwko tężcowi i błonicy są również podawane w szczepionkach typu 5 w 1 lub 4 w 1. W przypadku, gdy nie są Państwo pewni, które szczepienia otrzymało już dziecko, należy poprosić lekarza rodzinnego lub pielęgniarkę, aby sprawdzili te informacje.

Kto podaje szczepionkę?

Zazwyczaj szczepionka jest podawana w ramach szkolnego programu szczepień. Lokalna placówka służby zdrowia (HSE) powiadamia listownie o szczepieniach oraz wysyła formularz pisemnej zgody za pośrednictwem szkoły dziecka.

W hrabstwach Cavan, Donegal, Leitrim, Sligo, Monaghan, Meath, Louth oraz w części Północnego Dublinu program szczepień szkolnych HSE może nie obejmować szczepienia Td. W takim przypadku, HSE poprosi listownie o stawienie się z dzieckiem u lekarza rodzinnego, gdy nadejdzie termin wykonania szczepienia.

Co się stanie, gdy dziecka nie będzie w szkole w dniu podawania szczepień?

Dziecko i tak będzie mogło otrzymać szczepienie. HSE zorganizuje szczepienie dla dziecka w specjalnej klinice lub zostaną Państwo poproszeni o przyjście z dzieckiem do lekarza rodzinnego w celu wykonania szczepienia.

Czego oczekiwać po szczepieniu?

Bardzo rzadko występują skutki uboczne szczepienia Td. W miejscu wykonania zastrzyku dziecko może odczuwać ból, miejsce może spuchnąć lub zaczerwienić się. Dziecko może być rozdrażnione lub gorączkować. Wtedy należy podać dziecku paracetamol lub ibuprofen. Powinno ono również dużo pić. Należy upewnić się, że dziecku nie jest zbyt gorąco oraz że ubrania nie ocierają o miejsce, w które podano szczepionkę.

Komu nie powinno podawać się szczepionki Td?

Szczepionka Td jest bardzo bezpieczna. Istnieje niewiele powodów, dla których nie powinno się jej podawać. Należy przełożyć podanie szczepionki jeśli:

- dziecko miało silne objawy alergiczne na poprzednią dawkę szczepionki.
- dziecko ma gorączkę powyżej 38°C lub 100°F, chyba, że ma ranę, która mogłaby wywołać tężec.

Dodatkowe informacje

- Należy skontaktować się ze szkolnym zespołem ds. szczepień, lekarzem rodzinnym lub pielęgniarką
- Należy poprosić o kopię przewodnika dla rodziców **Your child's immunisations – A guide for parents** pielęgniarkę środowiskową
- Należy wejść na stronę www.immunisation.ie lub www.hpsc.ie

Wydano: HSE National Immunisation Office

Data wydania: Październik 2007

Kod zamówienia: HPM00483