

Vacina contra o tétano e a difteria Informações para os pais

O que é o tétano e a difteria?

Difteria é uma doença bacteriana contagiosa que pode provocar o desenvolvimento de uma membrana de pus no nariz, garganta ou vias respiratórias.

Sintomas: dor de garganta, temperatura elevada, dor de cabeça e aceleração da frequência cardíaca.

Possíveis complicações: insuficiência cardíaca, paralisia, problemas respiratórios graves ou dificuldades em respirar.

Tétano ('trismo') é uma doença que causa espasmos musculares graves e dolorosos.

Possíveis complicações: crises e dificuldades respiratórias. Na maioria dos casos é fatal.

Existe alguma vacina?

A **vacina Td** é um reforço que protege o seu filho contra o tétano e a difteria. A vacina funciona ao estimular o seu sistema imunológico a criar uma protecção contra estas doenças.

Quem necessita da vacina Td?

A vacina Td é administrada a crianças com idades compreendidas entre os 11 e os 14 anos. As vacinas contra o tétano e a difteria também são administradas como parte da vacina 5 em 1 ou 4 em 1. Se não tiver a certeza qual das vacinas foi administrada ao seu filho, peça ao seu médico de família (GP) ou à enfermeira da saúde pública para verificar o registo de vacinação.

Quem administra a vacina?

Normalmente, a vacina é administrada como fazendo parte do programa de vacinação escolar. O Serviço Executivo de Saúde (HSE) irá enviar-lhe uma carta e um formulário de consentimento através da escola do seu filho.

Nos distritos de Cavan, Donegal, Leitrim, Sligo, Monaghan, Meath, Louth e zonas do Norte de Dublin o programa de vacinação escolar HSE pode não oferecer a vacina Td. Neste caso o HSE irá enviar-lhe uma carta solicitando que leve o seu filho ao seu médico de família quando for altura de tomar a vacina.

O que acontece se o meu filho faltar no dia de vacinação na escola?

Ainda pode tomar a vacina. O HSE irá agendar uma deslocação do seu filho a uma clinica especial ou ser-lhe-à solicitado que leve o seu filho ao médico de família para que seja vacinado.

O que acontece após a vacina?

É bastante raro verificar efeitos secundários após a administração da vacina Td. O seu filho poderá ficar com a zona à volta do local da injeção encaroçada, inchada e vermelha. Poderão ficar

Td - Portuguese

irritáveis e ter febre. Se isto acontecer poderá administrar-lhes paracetamol ou ibuprofeno. Deverá dar-lhe também bastantes líquidos. Certifique-se de que não estão demasiado quentes e que as suas roupas não estão a friccionar a zona da injeção.

Quem é que não deve tomar a vacina Td?

A vacina Td é muito segura. São poucas as razões para que alguém não deva tomar a vacina.

Deverá evitar a administração da vacina se:

- o seu filho tiver obtido uma reacção alérgica grave a uma dose anterior da vacina.
- o seu filho tem febre acima dos 38 °C ou 100 °F, excepto se existirem ferimentos contaminados pelo tétano.

Para obter mais informações

- Contacte a sua equipa de vacinação escolar, o seu médico de família ou enfermeira.
- Peça a sua cópia do **A vacinação do seu filho – Um guia para pais** que pode obter junto da enfermeira da saúde pública
- Visite as páginas www.immunisation.ie ou www.hpsc.ie

Publicado pelo: HSE National Immunisation Office

Data de Publicação: Outubro de 2007

Código de Encomenda: HPM00483