

Вакцина против столбняка и дифтерии Информация для родителей

Что такое столбняк и дифтерия?

Дифтерия — это заразное бактериальное заболевание, которое может вызвать отёчность носа, горла или дыхательных путей.

Симптомы: боль в горле, повышенная температура, головная боль и учащённое сердцебиение.

Возможные осложнения: сердечная недостаточность, паралич, серьёзные проблемы дыхательной системы и трудности при дыхании.

Столбняк — заболевание, которое вызывает сильные болезненные мышечные спазмы

Возможные осложнения: судороги и трудности при дыхании.. Часто смертельно.

Существует ли вакцина?

Вакцина **Td** — это повторная вакцина, защищающая вашего ребёнка от заражения столбняком и дифтерией. Вакцина действует таким образом, чтобы стимулировать иммунную систему ребёнка для сопротивления этим заболеваниям.

Кому необходима вакцина Td?

Вакциной Td прививаются дети в возрасте от 11 до 14 лет. Вакцины против столбняка и дифтерии также входят в состав вакцин «5 в 1» или «4 в 1». Если вы не уверены, какие вакцины получил ваш ребёнок, попросите вашего семейного врача или участковую медсестру проверить их записи о прививках.

Кем может быть проведена вакцинация?

Обычно вакцина предлагается в рамках школьной программы вакцинации. Управление здравоохранения (HSE) передаст вам через школу письмо и форму о согласии.

В графствах Каван (Cavan), Донегол (Donegal), Литрим (Leitrim), Монахан (Monaghan), Мит (Meath), Лаут (Louth), Слайго (Sligo) и некоторых частях северного Дублина вакцина Td может не входить в школьную программу вакцинации HSE. В таком случае вам придёт письмо от HSE с просьбой в определённый момент отвести вашего ребёнка к семейному врачу.

Что случится, если мой ребёнок пропустит день вакцинации в школе?

Он по-прежнему может получить вакцину. HSE либо назначит дату вакцинации в специальной клинике, либо обратится к вам с просьбой отвести ребёнка к семейному врачу для проведения этой процедуры.

Чего следует ожидать после вакцинации

Побочные эффекты от прививки Td встречаются редко. Ребёнок может жаловаться на

набухание, зуд, покраснение или раздражение на месте инъекции. Ребёнок может стать раздражительным, у него может быть лихорадка. Если это произойдет необходимо дать ребёнку парацетамол или ибупрофен. Также необходимо обильное питьё. Убедитесь, что ребёнок одет не слишком тепло, а одежда не натирает место инъекции.

Кому не нужно получать вакцину Td?

Вакцина Td безопасна. Есть несколько причин, по которым не следует проводить вакцинацию Td. Вам следует отложить получение вакцины, если:

- предыдущая вакцинация вызвала у ребенка серьезную аллергическую реакцию.
- у ребенка температура выше 38°C или 100°F кроме случаев наличия раны, возможно, инфицированной столбняком.

Дополнительная информация

- Свяжитесь со школьным отделом вакцинации, своим семейным врачом или медсестрой.
- Получите экземпляр брошюры «**Your child's immunisations – A guide for parents**» (Вакцины для вашего ребёнка — справочник для родителей) у своей участковой медсестры
- Посетите сайты www.immunisation.ie или www.hpsc.ie

Опубликовано: HSE National Immunisation Office

Дата публикации: Октябрь 2007

Код заказа: НРМ00483