

Vaccinul diftero-tetanic Informații pentru părinți

Ce sunt tetanosul și difteria?

Difteria este o boală bacteriană contagioasă care determină formarea unei membrane groase la nivelul nasului, gâtului sau căilor aeriene.

Simptomele bolii: durere în gât, febră, cefalee și tahicardie.

Posibile complicații: insuficiență cardiacă, paralizie, probleme severe de respirație sau dispnee.

Tetanosul ('încleștarea fălcii') este o boală care determină spasme musculare severe, dureroase.

Posibile complicații: convulsii și dificultăți de respirație. Este adeseori fatală.

Există vreun vaccin?

Vaccinul Dt este un vaccin imunizant care vă protejează copilul împotriva tetanosului și difteriei.

Vaccinul acționează prin stimularea sistemului lor imunitar pentru a-și forma o protecție împotriva acestor boli.

Cine are nevoie de vaccinul Dt?

Vaccinul Dt este administrat copiilor între 11 și 14 ani. Vaccinurile diftero-tetanice fac de asemenea parte din vaccinurile 5 în 1 sau 4 în 1. Dacă nu sunteți sigur ce vaccinuri a făcut copilul dvs, rugați medicul dumneavoastră de familie (GP) sau asistenta de sănătate publică să verifice datele de înregistrare ale vaccinărilor.

Cine oferă vaccinul?

De obicei vaccinul se administrează în cadrul programului de vaccinare școlară. Executivul Serviciilor de Sănătate (HSE) vă va trimite o scrisoare și un formular de consimțământ prin școala copilului dumneavoastră.

În provincii cum ar fi Cavan, Donegal, Leitrim, Sligo, Monaghan, Meath, Louth și anumite zone din Dublinul de Nord, programul de vaccinare școlară al HSE poate să nu includă vaccinul Dt. În acest caz, HSE vă va trimite o scrisoare prin care vă va ruga să aduceți copilul la medicul dumneavoastră de familie când se face vaccinul.

Ce se petrece dacă copilul meu lipsește de la școală în ziua vaccinării?

Încă puteți să obțineți vaccinul. HSE va face aranjamente pentru imunizarea copilului dumneavoastră la o clinică specială sau veți fi rugat să aduceți copilul la medicul dumneavoastră de familie pentru vaccinare.

La ce vă puteți aștepta după vaccinare

Foarte rar se observă reacții secundare după administrarea vaccinului Dt. Copilul dumneavoastră poate avea la locul injecției o zonă dureroasă, inflamată sau roșie. Pot fi irascibili și pot avea

Td - Romanian

sindrom febril. Dacă apar astfel de manifestări puteți să le dați paracetamol sau ibuprofen. Trebuie să le dați să bea multe lichide. Asigurați-vă că nu le este prea cald și că hainele nu se freacă de zona injectată.

Cui nu ar trebui să i se administreze vaccinul Dt?

Vaccinul Dt este foarte sigur. Există puține motive pentru care nu ar trebui administrat. Ar trebui să amânați administrarea vaccinului dacă:

- Copilul dumneavoastră a avut o reacție alergică severă la o doză anterioară de vaccin.
- copilul dumneavoastră are febră peste 38°C sau 100°F, doar dacă nu are o rană ce ar putea duce la o infecție tetanică.

Pentru mai multe informații

- Contactați echipa responsabilă cu vaccinarea școlară, medicul dumneavoastră de familie sau asistenta de sănătate publică.
- Procurați un exemplar din **Imunizările copilului dumneavoastră – Un ghid pentru părinți** disponibil la asistenta dumneavoastră de sănătate publică
- Vizitați www.immunisation.ie sau www.hpsc.ie

Publicat de: HSE National Immunisation Office (Oficiul Național de Imunizare al HSE)

Data publicării: Octombrie 2007

Cod de comandă: HPM00483